

FRONTLINE Chien M : Composition qualitative et quantitative Une pipette de 1,34 ml contient: Substances actives: Fipronil 134,000 mg. Excipients, dont: Butylhydroxyanisole (E320) 0,268 mg, Butylhydroxytoluène (E321) 0,134 mg et Ethanol 0,134 ml. Forme pharmaceutique Solution pour spot-on. Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles Affections à parasites sensibles au fipronil. Chez les chiens de 10 à 20 kg Traitement curatif et préventif des infestations par les puces et les tiques. Elimination des poux broyeurs. La durée de protection contre les nouvelles infestations est de deux mois pour les puces et d'un mois pour les tiques. Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP). Posologie Une pipette de 1,34 ml pour un chien de 10 à 20 kg. En l'absence de données de tolérance, le minimum d'intervalle de traitement est de 4 semaines. Contre-indications En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chiots de moins de 8 semaines ou pesant moins de 2 kg. Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre, etc...) ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu. Ce produit a été spécialement développé pour les chiens : ne pas utiliser chez les chats car cela peut conduire à un surdosage. Précautions particulières d'emploi chez l'animal Il est important de veiller à appliquer le produit sur une zone où l'animal ne peut pas se lécher et à veiller à ce que les animaux ne se lèchent pas entre eux.

Précautions particulières à prendre par la personne ne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux Ce produit peut provoquer une irritation des muqueuses et des yeux. Donc éviter le contact du produit avec la bouche et les yeux. Les animaux ou les utilisateurs ayant une hypersensibilité connue aux insecticides ou à l'alcool devraient éviter le contact avec le médicament. Eviter le contact du contenu avec les doigts. Si cela se produit, se laver les mains avec de l'eau et du savon. En cas d'exposition accidentelle avec les yeux, rincer à l'eau pure avec soin. Se laver les mains après utilisation. Ne pas manipuler les animaux traités et ne pas autoriser les enfants à jouer avec les animaux traités jusqu'à ce que le site d'application soit sec. Il est donc recommandé que les animaux ne soient pas traités dans la journée mais plutôt en début de soirée, et que les animaux récemment traités ne soient pas autorisés à dormir avec les propriétaires, surtout les enfants. Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application. Effets indésirables (fréquence et gravité) En cas de léchage, une brève période d'hypersalivation principalement due à la nature de l'excipient peut être observée. Parmi les effets secondaires extrêmement rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (décoloration de la peau, alopecie locale, prurit, érythème) ainsi que du prurit ou une alopecie générale ont été rapportés. Exceptionnellement, de l'hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hyperesthésie, abattement, symptômes nerveux), des vomissements ou des symptômes respiratoires ont été observés après utilisation. Ne pas surdoser. Temps d'attente Sans objet. Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché MERIAL - 29 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON. Présentations Pipette à embout sécable de 1,34 ml FR/V/8858273 3/1996. Plaquette thermoformée de 1 pipette. Boîte de 1 ou 2 plaquette thermoformée de 3 pipettes. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes. Carte de 2, 4, 8 ou 12 pipettes. Date A.M.M. 12/11/96. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Classement du médicament en matière de délivrance Sans objet. Usage vétérinaire.