

FRONTLINE® Spray : Composition qualitative et quantitative Un ml contient : Substance active: Fipronil 2,5 mg. Forme pharmaceutique Solution pour pulvérisation cutanée. Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles Affections à parasites sensibles au fipronil chez les chiens et chats de moins de 5 kg pour FRONTLINE® Spray Pompe 0,5 ml et chez les chiens et chats de plus de 5 kg pour FRONTLINE® Spray Pompe 1,5 ml.

Chez les chiens:

- Prévention et traitement des infestations par les puces et les tiques.
- Elimination des poux broyeurs.

La durée d'efficacité contre les nouvelles infestations par les puces varie de 60 à 90 jours. La durée d'efficacité contre les nouvelles infestations par les tiques est d'environ 30 jours.

Chez les chats:

- Prévention et traitement des infestations par les puces et les tiques.
- Elimination des poux broyeurs. La durée d'efficacité contre les nouvelles infestations par les puces est d'environ 40 jours.

La durée d'efficacité contre les nouvelles infestations par les tiques est de 2 semaines. Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces (DAPP). Posologie Voie d'administration : cutanée, en pulvérisation. La posologie de base est de 7,5 mg de fipronil par kg de poids corporel (3 ml de solution par kg soit 6 pressions de la pompe 0,5 ml par kg et 2 pressions de la pompe 1,5 ml par kg). Cette posologie peut être portée jusqu'à 15 mg de fipronil par kg (6 ml de solution par kg soit 12 pressions de la pompe 0,5 ml par kg et 4 pressions de la pompe 1,5 ml par kg) pour tenir compte de la longueur des poils et permettre une imprégnation complète de l'animal. En l'absence de données de tolérance, l'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines. Contre-indications Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre) ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

Précautions particulières d'emploi chez l'animal Il est important de veiller à appliquer le produit sur une zone où l'animal ne peut pas se lécher et à veiller à ce que les animaux ne se lèchent pas entre eux. Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux Ce produit peut provoquer une irritation des muqueuses et des yeux.

Donc éviter le contact du produit avec la bouche et les yeux. Les animaux ou les utilisateurs ayant une hypersensibilité connue aux insecticides ou à l'alcool devraient éviter le contact avec le médicament. Eviter le contact du contenu avec les doigts. Si cela se produit, se laver les mains avec de l'eau et du savon.

En cas d'exposition accidentelle avec les yeux, rincer à l'eau pure avec soin. Se laver les mains après utilisation. Ne pas manipuler les animaux traités et ne pas autoriser les enfants à jouer avec les animaux traités jusqu'à ce que le site d'application soit sec. Il est donc recommandé que les animaux ne soient pas traités dans la journée mais plutôt en début de soirée, et que les animaux récemment traités ne soient pas autorisés à dormir avec les propriétaires, surtout les enfants. Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application.

Comme pour tous les insecticides, il est recommandé de porter des gants et de traiter les animaux dans un local bien aéré. Ne pas respirer le produit. Effets indésirables (fréquence et gravité) En cas de léchage, une brève période d'hypersalivation due à la nature de l'excipient peut être observée. Parmi les effets secondaires extrêmement rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires, érythème, prurit ou alopecie ont été rapportés après utilisation.

Exceptionnellement, de l'hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hyperesthésie, abattement, symptômes nerveux), des vomissements ou des symptômes respiratoires ont été observés après utilisation. Les effets observés sont susceptibles d'être plus sévères chez les chiots de moins de 6 mois. Ne pas surdoser. Temps d'attente Sans objet.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché Merial - 29 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON. Présentations FR/V/1803950 2/1994 Boîte de 1 flacon de 125 ml avec une pompe doseuse rempli à 100 ml et délivrant 0,5 ml par pulvérisation. FR/V/7290635 8/1994 Flacon de 250 ml ou 500 ml avec une pompe doseuse délivrant 1,5 ml par pulvérisation. Date A.M.M. 24/05/94.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. Classement du médicament en matière de délivrance Usage vétérinaire.